

ETIQUETA ORIGINAL INTODIGEST COMPR. MAST. X 60

MEDIDAS: 78 mm x 44 mm

FECHA: 09/12/2022

CARA

EN BOBINA



	ARTE & DISEÑO	DIRECCIÓN TÉCNICA	COMERCIAL
COLOR 	FIRMA FECHA: / / HORA: :	FIRMA FECHA: / / HORA: :	FIRMA FECHA: / / HORA: :

ETIQUETA ORIGINAL INTODIGEST COMPR. MAST. X 60

MEDIDAS: 170 mm x 48 mm

FECHA: 09/12/2022

MOTIVO DE LA REVISIÓN: Ajustes en las disposiciones de los textos (adaptación proporcional)

DORSO DEL FRASCO

EN BOBINA

FRENTE



into
DIGEST®

Comprimidos masticables - Vía Oral
Este producto se presenta en forma de comprimidos masticables con cuatro sabores distintos (naranja, durazno, cherry y tutti frutti).

Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene:
Carbonato de calcio.....750 mg
(equiv. a 300 mg de calcio)
Excipientesc.s.

Usos y Aplicaciones: El carbonato de calcio colabora en el bienestar del sistema digestivo, ya que proporciona una rápida, potente y prolongada neutralización del ácido gástrico al reaccionar con el ácido clorhídrico y producir cloruro de calcio, el cual posteriormente se convierte a sales de calcio insolubles en el tracto intestinal.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL			
Porción: 1 comprimido masticable			
Valor energético	Cantidad por porción	Cada 100 g	% IDR (*)
kcal	2	67	0
kJ	8	280	0
Proteínas	0	0	0
Carbohidratos	1,093 g	36,4 g	0
Grasas totales	0	0	0
Fibra alimentaria	0,108 g	3,6 g	0
Calcio	300 mg	10,000 mg	30

(*) Valores mayores a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Posología: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 o 2 comprimidos masticables, después de las comidas y a la hora de acostarse. Los comprimidos se deben masticar antes de tragárselos. Después de tomar este producto, se recomienda beber un vaso de agua.

Reacciones Adversas: En general, este producto suele ser bien tolerado. No obstante, pueden presentarse algunas reacciones adversas como: - Reacciones alérgicas: erupción cutánea, picazón o urticarias, edema de la cara, labios o lengua, dificultad para respirar. - Síntomas del aumento de calcio en sangre (hipercalcemia): confusión o irritabilidad, cefalea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, sabor metálico, cansancio o debilidad inusual, somnolencia y estreñimiento. El uso prolongado de este producto puede asociarse también con trastornos metabólicos como la alcalosis metabólica - síndrome leche-álcali.

Precauciones y Advertencias: Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna enfermedad y no supe una alimentación equilibrada. En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de consumir este producto. Este producto se debe administrar con precaución en cansancio extremo, presencia de heces de color oscuro o aspecto alquitranado o de hemorragia rectal, se debe suspender la administración, y consultar al médico. Se recomienda tomar este producto por lo menos 2 horas antes o después de otros medicamentos. El consumo de varios vasos de agua al día, ayudara a reducir la probabilidad de sufrir estreñimiento.
Advertencias sobre excipientes: Este producto contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este producto.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a algún componente de la fórmula. Hipercalcemia. Hipercalcúria grave. Insuficiencia renal grave.

Sobredosis: - *Síntomas.* Reacciones gastrointestinales. En pacientes que reciben concomitantemente altas dosis de vitamina D, pueden presentarse además signos y síntomas de hipercalcemia.
- *Tratamiento:* Usualmente la hipercalcemia es controlada por la suspensión del producto. Sin embargo, un cuadro de hipercalcemia grave, puede requerir manejo específico con infusión intravenosa de solución de cloruro de sodio, y diuresis forzada.

Ante la eventualidad de una sobredosis recurrir al hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología en el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción - Paraguay. Teléfono: (021) 220 416.

Presentación:
Frasco x 30 comprimidos masticables - Frasco x 60 comprimidos masticables - Frasco x 90 comprimidos masticables - Frasco x 120 comprimidos masticables.

Conservación: Mantener a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños.

Elaborado por **LABORATORIOS GALENO S.A.** - División **NATUHERBS**, Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López, km 15.200, San Lorenzo - Paraguay. - D.T.: Q.F. Gabriela Enciso - Reg. Prof. N° 4.671
Autorizado por la DINAVISIA.
Cert. Reg. San. 26751-01-SD

Venta Libre - Industria Paraguaya



DORSO

	ARTE & DISEÑO	DIRECCIÓN TÉCNICA	COMERCIAL
<p>COLOR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: cyan; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: magenta; border: 1px solid black;"></div> </div> <p>Cian - Magenta</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> </div> <p>Amarillo - Negro</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">FIRMA</p> <p>FECHA: / / HORA: :</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">FIRMA</p> <p>FECHA: / / HORA: :</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">FIRMA</p> <p>FECHA: / / HORA: :</p>